

## 사용상 주의사항

### 1. 다음 환자 ( 부위 ) 에는 투여하지 말 것

- 1) 30 개월 이하의 유아
- 2) 습진 , 옷 등에 의한 피부염 , 상처부위

### 2. 다음 사람은 신중히 투여할 것 .

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상 ( 예를 들면 발진 · 발적 ( 충혈되어 붉어짐 ) , 가려움 , 옷 등에 의한 피부염 등 ) 이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤 ( 습기 참 ) 이나 미란 ( 짓무름 ) 이 심한 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 소아 ( 경련을 유발할 수 있다 )

### 3. 부작용

이 약의 사용으로 발진 · 발적 ( 충혈되어 붉어짐 ) , 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다 .

### 4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다 . '
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다 .
- 3) 5,6 일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다 .

### 5. 적용상의 주의

이 약은 외용으로만 사용한다 .

### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 ( 뚜껑을 꼭 닫아 ) 보관한다 .
- 3) 오용 ( 잘못 사용 ) 을 막고 품질의 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다