

사용상 주의사항

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.

- 1) 30개월 이하의 유아
- 2) 눈 주위, 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위, 점막 등

2. 다음의 사람은 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상담하여 주십시오

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤(습기 참)이나 미란(긁무름)이 심한 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 소아(경련을 유발할 수 있다)

3. 다음의 경우에는 곧 사용을 중지하고, 이 설명서를 갖고 의사 또는 약사와 상담하여 주십시오.

- 1) 피부의 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 통증
- 2) 5-6일간 사용하여도 증상이 개선되지 않는 경우

4. 일반적 주의

- 1) 어린이에 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용하여 주십시오.
- 2) 환부(질환 부위)의 부위는 청결하게 하고, 땀 등은 잘 닦은 후 붙여 주십시오
- 3) 붙인 환부(질환 부위)를 난로나 전기담요 등으로 따뜻하게 하지 말아 주십시오.
- 4) 붙인 상태로 목욕을 하면 강한 자극을 느끼게 되므로 목욕하기 30분에서 1시간 전에 떼어내어 주십시오. 또한 목욕 직후의 침부는 피하여 주십시오.
- 5) 피부가 약한 분은 사용 전에 팔 안쪽의 피부가 약한 부위에 대략 1-2cm정도의 작은 절편을 12시간 이상 붙여서 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 염증 등의 증상이 일어나지 않는 것을 확인한 후 사용하여 주십시오.
- 6) 피부가 특히 약한 분은 동일한 부위에는 계속해서 붙이지 말아 주십시오.
- 7) 이 약은 외용으로만 사용하여야 하며, 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜주십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선이 닿지 않고, 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하여 주십시오
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣지 말아 주십시오.(오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질

이 변합니다.)

- 4) 품질 유지를 위하여 사용하지 않은 것은 호일에 넣은 후 이 약의 케이스에 넣어 보관하여 주십시오.
- 5) 사용기간을 경과한 제품은 사용하지 말아 주십시오.