

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유·소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것

- (1) 눈이나 눈 주위, 점막(예를 들면 구강, 비강, 질 등), 음낭, 외음부 등
- (2) 습진
- (3) 습윤(습기 참), 미란(긁무름), 외상(상처)이 심한 환부(질환부위)
- (4) 손톱, 두피

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- (2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질의 사람
- (3) 약에 의해 알레르기 증상을 일으켰던 적이 있는 사람
- (4) 환부(질환 부위)가 안면(얼굴) 또는 광범위의 사람
- (5) 환부(질환 부위)가 화농(꺾름)이 있는 사람
- (6) "습진" 또는 "무좀 , 완선(사타구니백선(증)), 체부백선"의 구분이 불확실한 사람
(가려움증 염증 등의 증상이 있다면 , 다른 원인에 의한 경우도 많다.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 사용 후, 다음의 증상이 나타났을 경우
피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 옷, 가려움, 부종(부기), 자극감, 열감, 피부박리(벗겨짐), 미란(긁무름)·건조, 피부균열(갈라짐)
- (2) 2주간 정도 사용해도 증상이 나아지지 않거나 본제(이 약)의 사용에 의해 증상이 악화되었을 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- (1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것
- (2) 환부(질환 부위)나 그 주위가 오염된 상태로 사용하지 말 것
- (3) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 씻고 즉시 안과의사의 진료를 받을 것
- (4) 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것
- (5) 사용 전에 잘 흔들어 줄 것

- (6) 환부(질환 부위)까지 5cm의 거리에서 분사, 또한 분무구를 잘 확인하고 안면(얼굴), 특히 눈을 향해 분사하거나 흡입하지 말 것
- (7) 동상 등의 우려가 있으므로, 같은 부위에 연속해 1초 이상 분사하지 말 것

6. 저장상의 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 시원한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것
- (2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- (3) 본 약이 묻은 손으로 눈이나 점막에 닿지 않도록 할 것
- (4) 사용 기한을 넘긴 제품은 사용하지 말 것
- (5) 본 약은 합성수지 등을 부드럽게 하거나 페인트를 녹일 수 있기 때문에 가구나 마루 등에 묻지 않게 할 것
- (6) 화기에 접근하지 말 것.