

## 사용상 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것: 이 약 성분에 과민증인 환자.
2. 다음 부위에는 적용하지 말 것: 이 약을 벗겨지거나 손상된 피부, 또는 최근에 면도한 부위에는 적용하지 말 것.
3. 일반적 주의
  - 1) 치료 대상 부위에만 사용하여야 하며 적용 부위는 완전히 건조한 상태를 유지 시켜야 한다.
  - 2) 눈이나 점막에 닿지 않도록 주의한다.
  - 3) 이 약을 사용 후 땀분비의 감소가 일시적으로 자극감이나 발적(충혈되어 붉어짐)을 초래할 수 있으며 이러한 증상이 심해지면 사용을 일시 중단하여야 한다.
4. 과다 적용시의 처치: 과다 적용시 자극감, 발적(충혈되어 붉어짐), 낙설이 일어날 수 있으며 이러한 증상이 나타났을 경우 필요에 따라 습윤(습기 참)제나 1% 히드로코르티손 크림을 바른다.
5. 적용상의 처치: 이 약을 적용하기 바로 직전에 목욕은 피해야 하며 적어도 적용 후 한시간은 지나야 한다. 겨드랑이의 털은 이 약을 적용하기 12 시간 전후로는 제거하지 말아야 한다.