

## [사용상의 주의사항]

### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 담도 폐쇄 환자
- 2) 전격성 간염 환자
- 3) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 5) 소아(동물실험에서 태자독성이 보고되어 있다)
- 6) 크론병과 같은 대장 및 소장염 환자
- 7) 방사선비투과성 석회화된 담석 환자
- 8) 비기능성 담낭(쓸개)환자, 급성 담낭(쓸개)염 환자
- 9) 신질환 환자
- 10) 소화성궤양(급성 위·십이지장 궤양) 환자(점막자극작용이 있으므로, 증상을 악화시킬 수 있다)
- 11) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 12) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

### 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 다음 의약품의 작용이 증강될 위험성이 있다 : 경구용 당뇨병용제(톨부타미드)
- 2) 다음의 약물은 이 약의 흡수를 방해한다 : 콜레스티라민, 콜레스티폴, 약용탄, 마그네슘 및 수산화알루미늄을 함유하는 제산제
- 3) 담즙(쓸개즙)에서 콜레스테롤을 감소시키는 약물(예, 에스트로겐 함유 경구용 피임제) 또는 혈액의 콜레스테롤을 감소시키는 약물(예, 클로피브레트)
- 4) 간에 손상을 주는 약물과 병용(함께 복용(사용))을 피한다.

### 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 심한 췌장질환 환자

2) 담석증 환자

3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히

투여해야 하는 환자

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.**

1) 소화기계 : 설사, 구역, 구토, 배 아픔, 변비, 가슴앓이, 위부불쾌감 등의 증상이 나타나는 경우

2) 과민반응 : 가려움, 발진 등이 나타나는 경우

3) 기타 : 전신권태감, 어지럼, 담석의 석회화, 간효소치의 증가(ALT, ALP, AST,  $\gamma$ -GT), 백혈구 감소가

나타나는 경우

4) 간질성 폐렴 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상을 동반한 간질성 폐렴이 나타나는 경우

**5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항**

1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.

2) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

3) 지방과부하로 특혈한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히  $\Downarrow$

조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는

지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

## 6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고발생이나 의약품의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.