

외형정보

· **성상** : 이 약은 흰색 내지 연노랑의 점착성 고체를 부직포상에 도포한 카타플라스마제이다.

성분정보

DL-카파 96.0mg, L-멘톨 76.8mg, 노닐산바닐릴아미드 0.23mg, 살리실산메틸 57.6mg

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

효능효과

다음 증상의 진통·소염(항염) : 타박상, 뺨, 요통, 어깨결림, 근육통, 관절통

용법용량

약면의 박리지를 벗기고 1일 1~3회 환부(질환 부위)에 붙인다.

사용상 주의사항

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.

- 1) 30개월 이하의 유아
- 2) 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진·발적, 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤이나 미란(진무름)이 심한 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 소아(경련을 유발할 수 있다)

3. 부작용

1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

2) 이 약의 사용으로 인해 때때로 심한 가려움이나 통증이 나타나는 경우에는 사용을 중지한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다.
- 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용한다.
- 2) 첩부환부를 회로나 전기모포 등으로 따뜻하게 하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.