

일반의약품 정보

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

유효성분 이 약 1매(10.0x10.0cm²)중

퓨시드산나트륨(KP) 29.94mg

효능효과

유효균종-포도구균, 적응증-농피증(고름피부증)(농가진(고름딱지증), 모낭염, 종기), 화상·외상(상처)·봉합창·식피창(피부 이식 후 생긴 상처)에 의한 2차 감염

용법용량

환부(질환 부위)를 깨끗이 하고 종이를 떼어낸 후 1일 1매 환부(질환 부위)에 직접 부착시킨다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 퓨시드산 및 그의 염에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 비감수성균(특히 녹농균)에 의한 감염 환자
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현(드러냄) 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
 - 감작(과민상태로 만듦)될 우려가 있으므로 충분히 관찰하고 감작(과민상태로 만듦)된 증후(가려움, 발적(충혈되어 붉어짐) 종창(부기), 구진, 소수포(물집)등)가 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 반복 투여 및 장기연용(계속 사용)으로 인해 비감수성균이 과잉증식할 수 있다. 만일 균교대증이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.
 - 안면(얼굴)에 부착시킬 경우에는 눈에 닿지 않도록 주의한다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임부 및 임신 가능한 여성에게 투여 시 이 약은 전신투여 시 태반관문을 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용 시 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않고 전신투여 시 유즙으로의 이행이 보고되었으나 국소사용 시 상용량에서는 유아에 영향을 미치지 않는다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것. 때때로 발진, 약한 동통(통증) 및 자극 등의 과민 반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 저장상의 주의사항
 - 냉소(시원한 곳)에 보존할 것.
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법

밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

유효기한

(연. 월. 일까지) 별도표기

첨가제

글리세릴로지네이트, 미리스트산이소프로필, 부틸히드록시톨루엔, 정제수, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 텔핀레진(Y·S레진), SIS co-polymer(폴리스티렌-폴리이소프렌-폴리스티렌 공중합체), 폴리에스터박리지, 폴리우레탄필름, 폴리이소부틸렌

[성상] 제1, 2, 3, 4 형은 무색 또는 미황색(연노랑)의 점착성물질을 폴리우레탄필름에 도포하고(바르고) 폴리우레탄필름을 고정시킨 후 박리지를 덮은 첩부제이다. 제5형은 무색 또는 미황색(연노랑)의 점착성물질을 폴리우레탄필름에 도포하여(바르고) 고체면에 박리지를 덮은 첩부제이다.

[포장단위] 2매/1포

[제조사] 신신제약(주) 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9, 소비자상담실 : 02-2030-1745, www.sinsin.com

※본 제품의 자세한 허가사항은 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 유효기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

※부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)